安桃樂鎮痛器

周年複試評分指引

2002/09

評分細節	給分
甲: 正確地分辨及說出安桃樂鎮痛器的 4 個組件名稱	
1) 考生能正確說出及指出安桃樂鎮痛器的 一 個組件名稱	1
2) 考生能正確說出及指出安桃樂鎮痛器的 二 個組件名稱	2
3) 考生能正確說出及指出安桃樂鎮痛器的 三 個組件名稱	3
4) 考生能正確說出及指出安桃樂鎮痛器的 四 個組件名稱	4
組件包括: D 型安桃樂氧氣樽(藍色樽身, 藍白雙間樽頭); 軛螺絲釘;面罩氣樽製匙容量錶;波形管;呼吸裝置	
乙: 正確地說出安桃樂鎮痛器應在那三種情況下使用	
1) 考生能正確說出 一 種情況下使用安桃樂鎮痛器	1
2) 考生能正確說出 二 種情況下使用安桃樂鎮痛器	2
3) 考生能正確說出 三 種情況下使用安桃樂鎮痛器	3
情況包括: 當其他處理痛楚的方法已經失效; 當已完成初步及進一步的評估; 能減輕傷病者的痛楚, 避免劇痛而引致休克	
丙: 正確地說出三種不適宜使用安桃樂鎮痛器的人士	
1) 考生能正確地說出 一 種不適宜使用安桃樂鎮痛器的人士	1
2) 考生能正確地說出 二 種不適宜使用安桃樂鎮痛器的人士	2
3) 考生能正確地說出 三 種不適宜使用安桃樂鎮痛器的人士	3
不適宜使用的人士: 不能聽從指示;醒程度下降; 懷疑有氣胸症;患有解壓病;處於密封場所;上面頷受傷;腹部腫脹;使用了硝酸甘油;任何有慢性阻塞性氣道痰病	
丁: 正確地示範安桃樂鎮痛器的使用程序	
(1) **向患者解釋安桃樂的使用步驟** :	
a) 考生向傷病者解釋氣體須吸入大約 2 分鐘後始有鎮痛效果	1
b) 考生能向傷病者解釋可能會有噁心,暈眩的情況發生	1
c) 考生向傷病者解釋由傷病者自行使用	1
d) 考生解釋傷病者須自行使用,手部受傷除外	1
(2) **示範如何使用密封面部及用力呼吸, 令傷病者了解如何自行使用**	
a) 考生示範密封面部	1
b) 考生示範用力呼吸	1
c) 考生問傷病者明唔明白	1
d) 明白後,考生叫傷病者自行使用	1
(3) **示範使用前將安桃樂氣樽反覆倒轉三次, 確保樽內氣體適當混合, 方可使用**	
a) 考生反覆倒轉 一 次安桃樂氣樽	
b) 考生反覆倒轉 二 次安桃樂氣樽	1
c) 考生反覆倒轉 三 次安桃樂氣樽	1
(4) **將裝有呼吸器的面罩給予傷病者, 確保使用方法正確**(可口述)	1
考生給裝有呼吸器的面罩給予傷病者後, 確保:	
a)安桃樂氣樽開關已開	
b)傷病者用手按面罩密封面部	1
c)傷病者用力呼吸	1
d)面罩充氣	1
(5) **密切觀察傷病者的情況.如傷病楚已經減輕或清醒程度下降, 則需停止使用**(可口述)	1
考生密切觀察傷病者, 下列情況則需停止使用:	
a) 傷病者痛楚已經減輕	
b) 傷病者清醒程度下降	1
c) 到醫院前兩分鐘	1
(6) **記錄及告知有關人員曾替傷病者使用安桃樂**	1
a) 考生用紙記錄曾替傷病者使用安桃樂	
b) 考生告知有關人員(考官)曾替傷病者使用安桃樂	1
(7) **次序及熟練地完成以上使用程序**	1
a)考生有次序地完成以上使用程序(由甲至丁項)	
b)考生熟練地完成以上使用程序(由甲至丁項)	1
	1
限時 8 分鐘(逾時會被停止考試)	
a) 考生**未能**於限時內完成	0
b) 考生能於限時 8 分鐘內完成	3